

En syg eller svækket frø vil derimod oftere sidde på terrariets bund og kropsmæssigt virke ”slank” og mindre muskuløs. Frøens hud skal være intakt, uden sår, hævelser eller misfarvede områder. Især området omkring nedre bug, gat og indersiden af bagbenene bør undersøges for forandringer. Misfarvede områder optræder med rødlig eller blålig farver. Hos skadede dyr optræder der ofte hvidlige ”vattede” eller svampede områder pga. infektion med bakterier og svampe. Hvis dyret undersøges, håndteres eller stresses, må det ikke udvise rystelser eller krampe-lignende bevægelser i benene. Man skal holde øje med at dyrene ikke bliver for fede, hvilket nemmest ses på folden over trommehinden. Hænger folden mere end halvt ned over trommehinden, får dyret for meget at spise, og hænger den ikke ned over trommehinden, er frøen for tynd og muligvis syg. Såfremt dyret ikke trives, skal man hurtigt søge kvalificeret hjælp samt isolere det syge dyr.

Andet: Da den opdrættes regelmæssigt i fangenskab, kan den ofte købes hos dyrehandlere og på dyremarkeder. Det kan svare sig at købe halvstore dyr, hvis de kan skaffes, da de er væsentligt mere hårdføre end frøer, der lige er gået på land. Kannibalisme kan forekomme både blandt voksne og unger, så hold derfor kun dyr af samme størrelse sammen.

Lovgivning: Arten må ikke indfanges og eksporteres fra Australien, men er i øvrigt ikke omfattet af nogen fredningsbestemmelser.

Frøgruppen
www.frøgruppen.dk

Denne pasningsvejledning er for hold af padder som hobbydyr. Disse padder kan også holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning. Ver. 1 2008/9 Michael N. Larsen

Pasningsvejledning for Koralfingerløvfrø



Foto: Henrik Bringsøe.

Videnskabeligt navn: *Litoria caerulea* (tidl. *Hyla caerulea*).

Dansk navn: Koralfingerløvfrø, White's Løvfrø.

Udseende: Koralfingerløvfrø er en stor kraftig løvfrø med glat hud på ryggen og nubret hud på bugen. Den har en tydelig trommehinde og store giftkirtler i nakken. Den har ofte en fold, der hænger ud over trommehinden og på fingre og tæer har den meget store sugekopper. Den har en stor bred mund og gulbrune øjne med en aflang linse. Som voksen måler den mellem 90-110 mm, og hunnerne er normalt størst. Arten er normalt græsgrøn med lys bug, men kan også være brun. De kan skifte farve efter humør og omgivelser.

Udbredelse i naturen: Koralfingerløvfrø lever i det nordlige, østlige og sydøstlige Australien, New Guinea samt omkringliggende øer. Den findes tit i og omkring menneskeboliger. Det er ikke ualmindeligt at finde den på sit badeværelse, hvis man bor i et område, hvor den forekommer. Den er blevet spredt en del uden for sit naturlige udbredelsesområde, og den findes derfor også på New Zealand, hvor den betragtes som et skadedyr.

Biologi: Koralfingerløvfrø er meget tilpasningsdygtig og findes i mange forskellige naturtyper. Den er vidt udbredt på fugtige biotoper i kystnære områder, men også i vinmarker, fugtig skov, tør skov samt steppe, der nærmest ligner en ørken. I de tørre områder findes den kun, hvis der er nogle vandsamlinger, der kan tjene som yngledamme. Den kan overleve en tørtid ved at gemme sig i hulheder i træer, under bark og sten. Hannerne sidder i vegetationen omkring yngledammene og kvækker i yngletiden fra september til marts. Hunnen lægger et meget stort antal æg.

Hold i terrarium: Koralfingerløvfrø er relativ hårdfør og nem at holde. En gruppe på 3-4 dyr kan holdes i et regnskovterrarium på ca. 60 x 40 x 60 cm (l x d x h). Arten er ikke social uden for yngletiden og kan holdes enkeltvis. Terrariet skal beplantes med kraftige slyngplanter som fx Guldranke, da frøerne er meget voldsomme ved beplantningen. Herudover bruges grene og korkbark som dekoration. Som bundlag kan bruges flis eller blot en bar glasbund. For at kunne styre luftfugtigheden og evt. opdrætte arten, er en 8-10 cm dybvanddel nødvendig i terrariet. Da den ikke svømmer særligt godt, er det vigtigt, at det er nemt at komme op fra vanddelen, fx via grene eller store sten. En temperatur på 24-26 °C er passende evt. med en natsækning ned til 20-22 °C. Terrariet skal overbruses en gang om dagen, så det holder en relativ luftfugtighed på 80-95 %. Da arten overvejende er nataktiv, er der ikke behov for lys udover, hvad planterne i terrariet har brug for. Arten er ikke sky og har ikke specielt behov for skjulesteder, da den gerne sidder fremme. Da arten spiser meget, skal terrariet gøres rent regelmæssigt, for at fjerne dyrenes efterladenskaber.

Foder: Koralfingerløvfrø er ukompliceret at fodre, da den spiser alt, hvad den kan gabe over. Voksne individer spiser spyfluer, Dubia-kakerlakker, vandregræshopper og fårekylinger. Pas på med museunger, da de feder og er en unaturlig kost for arten. Unger (dvs. dyr mellem 10 og 35 mm) spiser bananfluer, stuefluer, spyfluer, ovnfisk og små fårekylinger.

Arten er kendt for sin enorme appetit og bliver nemt for fed, hvis man ikke fodrer fornuftigt. Unger fodres dagligt, voksne 4-5 gange om ugen. Fodret skal overdrysses med et vitaminpulver inden det gives til frøen.

Hold med andre dyr: Den æder alt, hvad den kan gabe over, hvilket betyder, at mindre frøer og øgler som fx anoler bliver ædt. Den kan eventuelt holdes sammen med andre store løvfrøer, men den holdes bedst alene.

Adfærd: Sammenlignet med en del andre løvfrøer er den relativ dagaktiv. Den hopper ikke meget omkring, men foretrækker at vente på, at et bytte kommer forbi, hvorefter den springer de sidste 10-15 cm og overrumpler det. Ellers kravler den sindigt rundt i beplantningen. Den kvækker en del, specielt hvis man stimulerer den til yngeladfærd ved at give den en vanddel og hæve luftfugtigheden kraftigt.. Hvis man vil prøve at opdrætte arten, skal man gøre sig klart, at dens kvækken er høj og ikke noget, man ønsker i sit soveværelse!

Giftighed: Der foreligger ingen oplysninger om, at arten skulle være specielt giftig. Alligevel bør almindelige håndhygiejne overholdes, når man har håndteret sine dyr. Man bør så vidt muligt ikke holde om dyret med bare hænder af hensyn til frøens sarte hud. Det er bedre at bruge en gennemsigtig bøtte, når man skal indfange eller undersøge et dyr.

Levealder: Koralfingerløvfrøer kan leve længe i fangenskab. Opdrættede dyr, der holdes korrekt, kan sandsynligvis blive over 20 år gamle.

Sygdomstegn: En sund og rask Koralfingerløvfrø befinder sig hovedsageligt i terrariets øvre del og sidder synligt fremme uden at gemme sig. Kroppen skal være massiv, så frøen virker kraftig, når den sidder i hvilestilling. Ligeledes bør den have en voldsom appetit og villigt æde passende fødeemner.